



INFORMACIJE O CJEPIVU PROTIV PANDEMIČNE (H1N1) 2009 GRIPE

VAŽNO

Molimo vas pročitajte sve informacije na **OBJE strane ovog obrasca**

Popunite **SAMO zelene označene dijelove**

Osoba koja će vas cijepiti će otkinuti i pružiti vam dokaz o cijepljenju.

Trebali biste držati dokaz o cjevivu na sigurnom mjestu - to je vaš osobni dokaz o cijepljenju.

**** Osobe sa znanim teškim alergijama na jaja ne bi smjele primiti ovo cjevivo ****

CJEPIVO PROTIV PANDEMIČNE (H1N1) 2009 GRIPE

Pandemična (H1N1) 2009 gripa je nova vrsta virusa gripe. U većini slučajeva to je blaga bolest, ali za neke osobe ova gripa može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije ili smrt. Ovaj program cijepljenja će zaštititi ljude od infekcija, umanjiti broj gripnih virusa koji kruže u zajednici i pomoći u zaštiti od budućih napada virusa.

Panvax® H1N1 cjevivo koje dobijate napravljeno je istim procesom koji CSL koristi za proizvodnju cjeviva sezonske gripe za Australiju u posljednjih 40 godina.

Vakcina dolazi u multi-doznim bočicama (ili prethodno napunjenim špricama za djecu), za razliku od pojedinačno napunjenih šprica koje se koriste za cijepljenje od sezonske gripe. Iako cjevivo dolazi u višedoznim bočicama, nova igla i šprica se koriste za svaku osobu. Druga doza cjeviva može biti potrebna za djecu manju od deset godina, ali neće biti potrebna za odrasle ili za djecu stariju od deset godina.

Kako bi se cjevivo držalo sigurnim i sterilnim, višedozna bočica sadrži vrlo male količine konzervansa koji se zove thiomersal. Thiomersal se obično koristi u višedoznim bočicama i ima vrlo dobru sigurnosnu reputaciju.

Klinička ispitivanja su pokazala da je cjevivo bezbjedno po osobe koje su sudjelovale u ispitivanju.

Neprestano nadgledanje cjeviva će i dalje pratiti njegovu bezbjednost.

Nuspojave cijepljenja

Većina cjeviva će uzrokovati manje nuspojave poput niskog stupnja groznice, umora, bolova u mišićima i glavobolje, ili bola i crvenila na mjestu uboda. Kod većine ljudi, to će trajati samo kratko vrijeme. Vrlo rijetko se mogu pojaviti anafilaksije (teške alergijske reakcije koje mogu dovesti do gubitka svijesti i smrti ako se ne tretiraju brzo).

Neka inozemna izvješća, ali ne u Australiji, govore o mogućoj, vrlo rijetkoj vezi (1-2 slučaja na 1 milijun cijepljenih ljudi) između cijepljenja od gripe i stanja koje se naziva Guillain-Barré sindrom (GBS), poremećaj nervnog sustava koji može izazvati paralizu. Veza ovog stanja s gripnim cjevivom nije dokazana.

Kontraindikacije

Osobe koje su imale sljedeće ne bi smjele primiti Panvax® H1N1 cjevivo:

- anafilaksije nakon prethodne doze bilo kojeg cjeviva protiv gripe
- anafilaksije od bilo koje komponente cjeviva
- teške alergije na jaja.

Panvax® H1N1 cjevivo snabdjeva australaska vlada

Za daljnje informacije o Panvax® H1N1 cjevivu, kontaktirajte Telefonsku informacijsku službu za pandemiju (Pandemic Hotline) na **180 2007**

Njega nakon vakcinacije

- Za crvenilo i oticanje na mjestu uboda, stavite hladne obloge
- Za smanjivanje temperature ili ublažavanje nelagode, možete uzeti paracetamol
- Ako groznica ne prolazi, obratite se liječniku
- Pijte više tekućine i odmarajte se
- Ako se pojavi bilo kakva reakcija koju smatrate ozbiljnom ili neočekivanom, potražite zdravstveni savjet.
- Obratite se liječniku ako ste imali reakciju od bilo koje doze cjeviva ili ako su vam potrebni dalji zdravstveni savjeti.

Moguće nuspojave cijepljenja

Česte pojave:

Oko 1 od svakih 10 osoba će imati bolove i crvenilo na mjestu uboda, pospanost ili umor, bolove u mišićima; blaži oblik groznice

Vrlo rijetke pojave:

Teške alergijske reakcije (anafilaksije)

