



ИНФОРМАЦИЈЕ О ВАКЦИНИ ПРОТИВ ПАНДЕМИЧНОГ (H1N1) 2009 ГРИПА

ВАЖНО

- Молимо вас да прочитате све информације које се налазе на ОБЕ стране овог обрасца
- Попуните САМО делове који су назначени зеленом бојом

**Здравствени радник који вакцинише ће да отцепи и да вам да евиденцију о вакцинацији.
Треба да чувате евиденцију вакцинације на безбедном месту - то је ваша лична евиденција вакцинације.**

**** Особе са познатим тешким алергијама на јаја не би требало да приме ову вакцину ****

ВАКЦИНА ПРОТИВ ПАНДЕМИЧНОГ (H1N1) 2009 ГРИПА

Пандемични (H1N1) 2009 грип је нова врста вируса грипа. У већини случајева то је блага болест, али неким особама овај грип може да изазове озбиљне здравствене компликације или смрт. Овај програм вакцинација ће заштитити људе од инфекције, смањити број вируса грипа који циркулише у заједници и помоћи да се заштити од будућих таласа вируса.

Panvax® H1N1 вакцина коју добијате је произведена коришћењем исте процедуре коју су CSL користили да произведу сезонске вакцине против грипа за Аустралију током последњих 40 година.

Вакцина је пакована у бочицама за више доза (или претходно напуњен шприц за малу децу), а не као индивидуално претходно пуњене ињекције које се користе за сезонске вакцинације против грипа. Иако се вакцине пакују у бочицама за више доза, нова игла и шприц се користи за сваку особу. Друга доза вакцине може бити потребна за децу испод десет година, али неће бити потребна за одрасле или за децу од десет година и навише.

Да би вакцина била безбедна и стерилна дозе са више бочица садрже веома малу количину конзерванса који се зове тиомерсал. Тиомерсал се обично користи са бочицама за више доза и за њега се дуго зна да је безбедан. Клиничким испитивањем је доказано да је вакцина безбедна код оних који су учествовали. Безбедност вакцине ће се пратити редовном проценом.

Нус ефекти вакцинација

Већина вакцина изазива мање нежељене догађаје као што су ниски ниво грозница, умор, болови у мишићима и главобоље, или бол и црвенило на месту убода ињекције. Код већине особа, то ће трајати само кратко време. Врло ретко може да дође до анафилаксе (озбиљне алергијске реакције која може да резултира у несвестици и смрти ако се не третира брзо).

Било је извештаја у иностранству, али не у Аустралији, о могућим веома ретким асоцијацијама (1-2 случаја од 1 милион људи који су вакцинисани) између вакцина против грипа и стања које се зове Guillain-Barré синдром (GBS), поремећај нервног система који може изазвати парализу. Асоцијација са овом вакцином није доказана.

Контраиндикације

Људи који су искусили следеће не би требало да приме вакцину Panvax® H1N1:

- анафилаксу након претходне дозе било које вакцине против грипа
- анафилаксу након било које компоненте вакцине
- тешку алергију на јаја.

Panvax® H1N1 вакцину пружа вам Аустралијска влада

За додатне информације о Panvax® H1N1 вакцини, обратите се Pandemic Hotline на број **180 2007**

Нега после вакцинације

- За црвенило или оток на месту убода ињекције, примените хладне облоге
- Да снизите температуру или олакшате нелагодност, можете да узмете парацетамол (paracetamol)
- Ако температура потраје, обратите се лекару
- Пијте доста течности и одмарајте се
- Ако дође до било какве реакције коју сматрате озбиљном и неочекиваном, потражите медицински савет
- Обратите се свом лекару ако сте имали реакцију после било које дозе вакцине или ако су вам потребни додатни лекарски савети.

Могући нус ефекти вакцине

Уобичајени:

Око 1 од 10 особа може да има бол и црвенило на месту убода ињекције, да је поспан или уморна, да има болове у мишићима, ниску температуру

Веома ретки:

Тешке алергијске реакције (анафилакса)

